

616.22-07

CLINICA UNIVERSITARIA Y ESCUELA PROFESIONAL DE OTORRINO-
LARINGOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA
(DIRECTOR: Prof. J. MARCO)

LA CITOLOGIA COMO MEDIO DIAGNOSTICO DE LAS AFECCIONES LARINGEAS. NOTA PREVIA

Dres. LUIS BLAY GALAUD; CARLOS SPREKELSEN GASSÓ
y JESÚS ALGABA GUIMERÁ

(Valencia)

La citología exfoliativa como método diagnóstico ha demostrado ya ampliamente su validez en las afecciones del cuello del útero. La precisión diagnóstica en cuanto a la existencia de un carcinoma genital, en un grupo de pacientes no seleccionados, oscila entre un 80 y un 95 % y en el carcinoma de cérvix asciende hasta un 90 ó 95 % (SMOLKA, 1966). BESSERER, G., de la Clínica Ginecológica de Kiel, encuentra en 7852 pacientes y más de 10.000 frotis vaginales, una precisión del 93,5 %. GRAHAM, R. halla el 90,3% en 18.303 pacientes estudiados.

Estos resultados han animado a diversos autores a emplearlo en otras regiones del organismo. En el campo otorrinolaringológico, y en particular en la laringe, ya existen varios estudios. La similitud de su epitelio con el del cuello uterino, su difícil exploración como órgano cavitario y la importancia del diagnóstico precoz del carcinoma, creemos han sido los motores de la investigación.

Nosotros hemos estudiado la citología exfoliativa en 30 pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 28 y los 69 años, afectos de diversas lesiones laringeas: 14 epitelomas

SUMMARY

THE CITOLOGY IN THE DIAGNOSIS OF LARYNGEAL DISEASES. PREVIOUS REPORT.

In 133 subjects normal and cancer patients, the exfoliative cytology of the larynx was studied in samples stained with Papanicolau and May-Gründwald-Giemsa, taken through direct laryngoscopy and mucous scraping. Much positive findings were elicited with this technique. The AA. recalls the importance of E.C. in allowing to fixe the evolutive degree of the growth and subsequently the prognosis of the tumour.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE ZYTOLOGIE ALS DIAGNOSTISCHE HILFE IN DER KEHLKOPFERKRANKUNGEN. ERSTE BERICHT.

In 133 Fälle (normal und krebsartige) die V. haben positive Erzeugen über Krebszellen erreicht, bei Zellen-Verfärbung nach Papanicolau und May-Gründwald-Giemsa Methoden, durch direkte Laryngoskopie und Auskratzen der Schleimhaut.