

Servicio y Escuela Profesional de O.R.L. del Hospital Clínico Universitario  
de Valencia (Director: Prof. J. MARCO).

Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valencia  
(Director: Prof. V. BELLOCH).

## Linfografía cervical isotópica

Por los doctores

LUIS BLAY, JOSE LUIS GENOVES, CARLOS SPREKELSEN,  
CARMELO ROMERO y FRANCISCC JAVIER CASTILLO

El conocimiento lo más exacto posible de la extensión de las afecciones neoplásicas y la consecuente aplicación de la más adecuada terapéutica para conseguir su curación ha originado la puesta en marcha de múltiples procedimientos diagnósticos destinados a este fin. Y uno de los problemas que fundamentalmente se plantean a la hora de aplicar los tratamientos, como es la invasión ganglionar, constituye la base de diversos tipos de exploración que tiene por finalidad determinar la amplitud del acto terapéutico. Y dentro del amplio campo de la Oncología, y dada la frecuencia de los cánceres de la esfera O.R.L., en general, y de la laringe en particular, ha hecho que nos preocupemos más específicamente del mismo.

Para el desarrollo del presente trabajo hemos querido en primer lugar hacer un breve resumen anatómico del sistema linfático cervical.