

Linfoma no hodgkiniano de célula T del conducto auditivo externo

Araceli González Delgado, Francisco Argudo Marco, Nieves Sánchez Martínez y Carlos Sprekelsen Gassó
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

El desarrollo de un linfoma primario en el meato auditivo externo es excepcional. Presentamos el caso de una mujer de 53 años, que desarrolló un linfoma no hodgkiniano de célula T y revisamos la literatura. Diez meses después del inicio del tratamiento (cirugía y quimioterapia) permanece libre de enfermedad.

Palabras clave: Linfoma. Conducto auditivo externo. Célula T.

T Cell Non-Hodgkin's Lymphoma of the External Auditory Canal

Developing of primary lymphoma of the external auditory canal is exceptional. We describe a 53 years old woman who developed a T cell non-Hodgkin's lymphoma and review literature. She was treated with surgery and chemotherapy and remains disease-free 10 months after the treatment.

Key words: Lymphoma. External auditory canal. T cell.

Correspondencia: Dra. A. González Delgado.
Plaza Circular, 11, 5.º C. 30008 Murcia. España.
Correo electrónico: kotmwt@yahoo.es

Recibido el 13-6-2007.

Aceptado para su publicación el 29-11-2007.