



EXAMEN DE JULIO (24-VI-2022)

1. (2.5 pto.) Un oscilador armónico está descrito por la siguiente función de estado

$$\Psi(x) = N (\phi_0(x) + 2i \phi_1(x))$$

donde ϕ_0 y ϕ_1 son las funciones propias correspondientes al estado fundamental y al primer estado excitado.

- Calcule N para que la función esté normalizada.
- Calcule el valor medio de la posición.
- Calcule la probabilidad de que al medir la energía del sistema el resultado sea $\frac{3}{2}h\nu$.

2. (2.5 pto.) Considere un electrón de un átomo hidrogenoide descrito mediante un orbital $1s$.

- Calcule los valores medios de las energías cinéticas y potencial expresando los resultados en función de Z , k , e y a_0 .
- Calcule la probabilidad de encontrar el electrón a distancias mayores que el valor medio de r .

3. (2.5 pto.) Considere los siguientes valores experimentales de las energías de disociación (D_e) y distancias internucleares de equilibrio (r_e) para diversas moléculas diatómicas homonucleares

Molécula	D_e (eV)	r_e (Å)
H_2^+	2.79	1.06
H_2	4.75	0.741
He_2^+	2.5	1.08
He_2	0.0009	3.0
N_2^+	8.85	1.12
N_2	9.91	1.10
O_2^+	6.78	1.12
O_2	5.21	1.21

Razone de acuerdo con la Teoría de Orbitales Moleculares las diferencias que se observan en los valores de D_e y r_e entre las moléculas neutras (A_2) y también con respecto a los correspondientes al ión molecular (A_2^+).

4. (2.5 pto.) El origen de banda fundamental de la molécula CO aparece a 2143 cm^{-1} y el del primer sobretono a 4260 cm^{-1} . Calcule los valores de las constantes espectroscópicas ω_e y $\omega_e\chi_e$ (en cm^{-1}), así como su energía de disociación D_e y D_0 (en eV).

FORMULARIO Y CONSTANTES FÍSICAS

Formulario

$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$	$E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{8ml^2}$	$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right); n = 1, 2, \dots$
$\hat{l}_z(\phi) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi}$	$\hat{l}_z(\phi)\psi_m(\phi) = m\hbar \psi_m(\phi)$	$\psi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}$
$E_m = \frac{m^2\hbar^2}{2MR^2}; m = 0, \pm 1, \dots$	$\hat{H}(\theta, \phi) = \frac{\hat{L}^2(\theta, \phi)}{2I} = \frac{\hat{L}^2(\theta, \phi)}{2mR^2}$	$\hat{L}^2(\theta, \phi) = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$
$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$	$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	$\hat{L}^2 \psi_{l,m_l} = l(l+1)\hbar^2 \psi_{l,m_l}; l = 0, 1, \dots$
$< r >_{n,l} = \frac{a_0}{2Z} [3n^2 - l(l+1)]$		$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
$\int_0^\infty r^n e^{-br} dr = \frac{n!}{b^{n+1}}$	$\int_t^\infty z^n e^{-bz} dz = \frac{n!}{b^{n+1}} e^{-bt} \left(1 + bt + \frac{(bt)^2}{2!} + \frac{(bt)^3}{3!} + \dots + \frac{(bt)^n}{n!} \right)$	
$\int_0^\infty e^{-bx^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{b}}$	$\int_0^\infty x e^{-bx^2} dx = \frac{1}{2b}$	$\int_0^\infty x^2 e^{-bx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4b^{3/2}}$
$\int_0^\infty x^4 e^{-bx^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8b^{5/2}}$		$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2} + C$
		$\int x \sin^2(ax) dx = -\frac{1}{8a^2} (2ax \sin(2ax) + \cos(2ax) - 2a^2x^2) + C$
		$\int x^2 \sin(ax) dx = \frac{2ax \sin(ax) + (2 - a^2x^2) \cos(ax)}{a^3} + C$
		$\int x^2 \sin^2(ax) dx = -\frac{1}{24a^3} ((6a^2x^2 - 3) \sin(2ax) + 6ax \cos(2ax) - 4a^3x^3) + C$

Constantes físicas

$R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$R = 1.98 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	$R = 0.082 \text{ atm l mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
$h = 6.62608 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$	$m_e = 9.10939 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
$a_0 = 5.292 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	$c = 2.9979 \cdot 10^8 \text{ m/s}$	$1 \text{ uma} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Factores radiales de los orbitales atómicos

$$R_{1s} = 2 \left(\frac{Z}{a_o} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_o}$$

$$R_{2s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{Z}{a_o} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a_o} \right) e^{-Zr/2a_o}$$

$$R_{2p} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a_o} \right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_o}$$

$$R_{3s} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{a_o} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{2Zr}{3a_o} + \frac{2Z^2r^2}{27a_o^2} \right) e^{-Zr/3a_o}$$

$$R_{3p} = \frac{8}{27\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a_o} \right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a_o} - \frac{Z^2r^2}{6a_o^2} \right) e^{-Zr/3a_o}$$

Armónicos esféricos. $Y_{l,m}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} S_{l,m}(\theta) e^{im\phi}$

$$\int_0^\pi |S_{l,m}|^2 \sin \theta d\theta = 1$$

$$l = 0 : \quad S_{0,0} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$l = 1 : \quad S_{1,0} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \cos \theta$$

$$S_{1,\pm 1} = \frac{1}{2}\sqrt{3} \sin \theta$$

$$l = 2 : \quad S_{2,0} = \frac{1}{4}\sqrt{10}(3 \cos^2 \theta - 1)$$

$$S_{2,\pm 1} = \frac{1}{2}\sqrt{15} \sin \theta \cos \theta$$

$$S_{2,\pm 2} = \frac{1}{4}\sqrt{15} \sin^2 \theta$$

$$l = 3 : \quad S_{3,0} = \frac{3}{4}\sqrt{14}(\frac{5}{3} \cos^3 \theta - \cos \theta)$$

$$S_{3,\pm 1} = \frac{1}{8}\sqrt{42} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1)$$

$$S_{3,\pm 2} = \frac{1}{4}\sqrt{105} \sin^2 \theta \cos \theta$$

$$S_{3,\pm 3} = \frac{1}{8}\sqrt{70} \sin^3 \theta$$

Funciones propias del oscilador armónico ($\alpha = \mu\omega/\hbar$)

$$\psi_0 = \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$$

$$\psi_1 = \sqrt{2\alpha} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4} x e^{-\alpha x^2/2}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4} (2\alpha x^2 - 1) e^{-\alpha x^2/2}$$

$$\psi_3 = \sqrt{3} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4} (\frac{2}{3}\alpha^{3/2}x^3 - \alpha^{1/2}x) e^{-\alpha x^2/2}$$

$$\psi_4 = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{1/4} (2\alpha^2 x^4 - 6\alpha x^2 + \frac{3}{2}) e^{-\alpha x^2/2}$$

Ajuste por mínimos cuadrados ($y = ax + b$)

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$